


Conversion des Unités - Dosage du Cuivre

Maladie de Wilson

Cuprurie $\mu\text{mol/L}$	Cuprurie $\mu\text{g/L}$
0,40	25,4
0,60	38,1
1,00	63,6
1,50	95,3
2,00	127,1
2,50	158,9
3,00	190,7
3,50	222,4
4,00	254,2
4,50	286,0
5,00	317,8

 = Normal

 = Evocateur de la
Maladie de Wilson

Cuprémie $\mu\text{mol/L}$	Cuprémie $\mu\text{g/L}$
0,25	15,9
0,50	31,8
0,75	47,7
1,00	63,6
2,00	127,1
2,50	158,9
5,00	317,8
7,50	476,6
10,00	635,5
15,00	953,3
22,00	1398,1




Conversion des Unités - Dosage du Cuivre

Maladie de Wilson

Cuivre Hépatique/g de tissu sec	
$\mu\text{mol/g}$	$\mu\text{g/g}$
0,40	25,4
0,65	41,3
1,00	63,6
2,00	127,1
3,00	190,7
4,00	254,2
6,00	381,3
8,00	508,4
10,00	635,5
15,00	953,3

Cuivre Echangeable $\mu\text{mol/L}$
0,30
0,62
1,00
1,23
1,30
1,50
2,50
3,00
4,00
5,00

REC
Cuivre échangeable
Cuivre total
%
2,00
3,40
8,00
10,00
12,00
15,00

-  = Normal
-  = Evocateur d'hétérozygotie
-  = Evocateur de la Maladie de Wilson